Stanovení indexu stáda

> **Index stáda** je relativní **vyjádření užitkovosti dojnice** za normovanou laktaci v **kg bílkovin** vzhledem **k průměrné užitkovosti stáje za posledních 12 měsíců.**

> K naleznutí na kontrolním listu krávy v Databázi plemenic (lze i přes aplikaci eSkot).

Při výpočtu indexu stáda je požadováno alespoň 20 vrstevnic, přičemž za vrstevnice se považují všechny krávy, které ukončily normovanou laktaci ve stejném stádě – stáji v posledních 12 měsících (za 12. měsíc se považuje poslední zpracovaný), bez ohledu na plemennou příslušnost. Pro tyto účely se provádí přepočet mezi plemennými skupinami.

Druhé a vyšší laktace jsou dále přepočteny na jednotné pořadí laktace, podle koeficientů.

Tabulka 32: Přepočtové koeficienty pro užitkovost v kg bílkovin mezi plemennými skupinami

Číselné pořadí	Plemeno	Přepočtové koeficienty	
		1. laktace	2. a další laktace
1.	C 100	1.000	1.000
2.	C 76–99	1.023	1.028
3.	C 75	1.015	1.042
4.	C 51–74	1.045	1.056
5.	C 50	1.061	1.069
6.	C 26–49	1.061	1.063
8.	H 100	1.280	1.181
9.	H 76–99	1.167	1.125
10.	H 75	1.144	1.104
11.	H 51–74	1.144	1.111
12.	H 50	1.098	1.076
13.	H 26–49	1.045	1.069
14.	H 25	1.023	1.056

Pozn.: Plemena H a R se nerozlišují, takže kráva plemene C75 R25 je přepočítávána podle koeficientu číslo 14., plemena H a R mají tedy v přepočtu přednost před plemenem C.

Tabulka 33: Přepočtové koeficienty pro přepočet podle pořadí laktace

Pořadí laktace	Přepočtové koeficienty	Pořadí lakt
1.	-	6.
2.	0.975	7.
3.	1.000	8.
4.	1.006	9.
5.	0.994	10.

Revize č. 10
Vytvořeno 21 listopadu 2025 22:15:42 uživatelem Michaela Švestková
Aktualizováno 1 dubna 2026 14:20:12 uživatelem Michaela Švestková