Varianta A4-P s celkovým výdojkem a pom?rným vzorkováním

Zjišt?ní dojivosti

U této metody se zjišťuje množství nadojeného mléka jako celkový výdojek za kontrolní den, který je tvořen součtem dílčích výdojků v kontrolním dnu. K příslušné dojivosti je připojen individuální vzorek.

Odebíraný individuální vzorek musí být vždy reprezentativní o celkovém objemu 25-30 ml a musí splňovat níže uvedená kritéria.

Vzorkování

- Pokud při technologii dojení se nachází **interval mezi dojeními 10–14 hodin**, skládá se celkový objem individuálního vzorku ze dvou stejně velkých objemů z večerního a ranního dojení **(dvojí dojení).**
- Pokud při technologii dojení se nachází interval mezi dojeními 8 ± 0,5 hodiny, skládá se celkový objem individuálního vzorku ze třech stejných objemů z každého dílčího dojení **(trojí dojení).**
- Při technologii **trojího dojení s nepravidelným časovým intervalem (nepravidelné trojí dojení)** je využíván následující postup. Odběr dvou poměrných vzorků v systému nepravidelného trojího dojení je identický s odběrem poměrných vzorků při dojení 2x denně. Odběr poměrných vzorků se tedy týká večerního a ranního dojení. Odebírá se poměrný vzorek o stejném objemu z ranního a večerního dojení od všech dojnic do skončení laktace. Z třetího dojení (dojení, které nesplňuje pravidelný interval) se nevzorkuje.

> Dojivost krav v kg se uvádí za celý kontrolní den.

- Pokud při technologii dojení se nachází interval mezi dojeními 6 hodin, skládá se celkový objem poměrného vzorku ze čtyř stejných objemů z každého dílčího dojení.

- V ostatních případech je nutné odebírat poměrné vzorky, jejichž objemové složení odpovídá objemu výdojků v kg jednotlivých dílčích dojení (např. systém 1 ml vzorku → 1 kg mléka).
- Objem mléka, ze kterého se bude odebírat individuální vzorek, musí být bezprostředně před odběrem dostatečně promíchán dle pokynů výrobce měřiče; pokud není měřič konstruován k automatickému odběru individuálních vzorků, mléko se přelije do jiné nádoby odpovídající velikosti a odtud je individuální vzorek odebrán.
- Pracovník, provádějící KU je povinen maximálně omezit styk mléka určeného k odběru individuálních vzorků se stájovým prostředím a musí zajistit identifikovatelnost individuálního vzorku.
- Individuální vzorek mléka musí být konzervován.

> U metody A4-P nedochází k přepočtu složek!

Tabulka 12: Číselník pro metodu A4-P.

Označení ve jmenovce stájí		Označení v rozborovém protokolu	
způsob zajištění KU	1	denní doba	3
způsob provádění KU	6	interval dojení	0

Revize č. 9
Vytvořeno 21 listopadu 2025 22:10:29 uživatelem Michaela Švestková
Aktualizováno 20 ledna 2026 13:32:18 uživatelem Michaela Švestková